

CYTOTEC TABLET 200 MCG

Bevat per tablet 200 microgram misoprostol (werkzame stof)

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof misoprostol

Werking

Door het samentrekken van de baarmoederspier helpt misoprostol (Cytotec) bij het afbreken van de zwangerschap. De zwangerschapsafbreking is al in gang gezet door een tablet mifepriston (Mifegyne) van 200 mg die u in de kliniek heeft ingenomen.

Dosering

24 tot 72 uur na de mifepriston worden 4 tabletten misoprostol van 200 microgram ingebracht in de vagina of de wangzakken.

Als de tabletten worden geslikt (hoewel wij dit niet adviseren), is het raadzaam dit bij de maaltijd te doen.

LET OP: u **moet** deze tabletten gebruiken, óók als u al bent gaan bloeden als gevolg van de mifepriston.

Wanneer begint de werking

Het bloedverlies zal in ongeveer 95% van de gevallen binnen 24 uur optreden.

Bijwerkingen

Bij meer dan 10% van het gebruik zal diarree optreden. Deze verdwijnt vanzelf

Bij 1-10% kunnen bijwerkingen optreden als maagdarmklachten (misselijkheid, overgeven, verstopping), hoofdpijn en duizeligheid. Ook is misoprostol schadelijk voor de vrucht in 10% van de gevallen. Daarom raden wij bij eventueel mislukken van de zwangerschapsafbreking met de abortuspil, een zuigcuretage aan.

Borstvoeding

Door het gebruik van misoprostol is het mogelijk dat een baby door borstvoeding diarree krijgt. Daarom het advies om gedurende 12 uur af te kolven en de melk niet te gebruiken.

Overige opmerkingen

Misoprostol is in Nederland op de markt als een middel dat de maag beschermt tegen overmatig maagzuur bij het gebruik van pijnstillers zoals bijvoorbeeld Diclofenac.

Als middel voor een zwangerschapsafbreking is het eigenlijk niet geregistreerd. Een arts mag een middel wel 'off label' voorschrijven als daar een indicatie voor is. Het is uitgebreid aangetoond dat misoprostol goed werkt als medicatie bij een zwangerschapsafbreking.

MIFEGYNE TABLET 200 MG

Bevat per tablet 200 milligram mifepriston (werkzame stof)

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof mifepriston

Werking

Mifepriston (Mifegyne) blokkeert de werking van progesteron, het hormoon dat een zwangerschap ondersteunt en laat groeien. Daarom kan het gebruikt worden om een zwangerschap af te breken.

Dosering

Na een intakegesprek heeft u in de kliniek een tablet van 200 mg mifepriston ingenomen. Volgens de fabrikant zou u drie tabletten in moeten nemen. In veelvuldig wetenschappelijk onderzoek is uitgebreid aangetoond dat 1 tablet net zoveel kans op succes heeft als 3 tabletten.

Wanneer begint de werking

Het middel begint meteen te werken. Tevens heeft u misoprostol (Cytotec) mee naar huis gekregen om te zorgen dat de bloeding op gang komt. Bij een behandeling met de abortuspil (dus samen met de 4 misoprostol tabletten kan soms veel bloedverlies optreden. In ongeveer 1 op 2000 gevallen zou een bloedtransfusie nodig kunnen zijn.

Bijwerkingen

In het algemeen heeft mifepriston weinig bijwerkingen. Sporadisch kan huiduitslag en duizeligheid optreden; andere bijwerkingen zijn nog zeldzamer.

Borstvoeding

Mifepriston komt maar in heel kleine hoeveelheden in de borstvoeding terecht. U kunt de borstvoeding voortzetten tot de inname van de misoprostol.

Overige opmerkingen

Gebruik van bepaalde medicamenten kan de werkzaamheid van mifepriston verminderen. Dit zijn o.a. Corticosteroiden, middelen tegen schimmels, Erythromycine en Rifampicine en middelen gebruikt bij epilepsie.

Mifepriston moet niet met grapefruitsap worden ingenomen.

2016 / versie 01